

Tarmsmitta - åtgärder

	Tarmsmitta	Inkubations- tid	Kontrollodling/ Kontrollprov	Riskyрке* Sjukskrivning	Förskolebarn Avstängning	Anmälnings- pliktig	Förhållnings- regler	Smittspårnings- pliktig	Kontakt med Smittskydd (SME)
Bakterier	<i>Campylobacter</i>	2-5 dygn (1-10 dygn)	Nej	Åter vid symtomfrihet	Åter vid symtomfrihet	Ja	Ja, se smittskyddsblad	Ja, se smittskyddsblad	Smittskyddsanmälan
	<i>Clostridium difficile</i>	-	Nej	Åter vid symtomfrihet	Åter vid symtomfrihet	Nej	Nej	Nej	-
	<i>EHEC</i>	2-4 dygn (1-8 dygn)	Ja, riskyрке/förskolebarn med stx2 pos eller stx1 med HUS, se smittskyddsblad	Åter efter ett neg fecesprov	Åter efter ett neg fecesprov	Ja	Ja, se smittskyddsblad	Ja, se smittskyddsblad	Kontakta alltid SME Smittskyddsanmälan
	<i>Salmonella</i>	12-48 timmar (6-72 timmar)	Ja, vid riskyрке	Omplacering om möjligt, åter efter en negativ fecesodling	Åter vid symtomfrihet	Ja	Ja, se smittskyddsblad	Ja, se smittskyddsblad	Smittskyddsanmälan
	<i>Shigella</i>	2-3 dygn (1-7 dygn)	Ja, vid riskyрке och förskolebarn	Kontrollprov tidigast en vecka efter avslutad beh. Återgå efter ett neg kotrollprov.	Kontrollprov tidigast en vecka efter avslutad beh. Återgå efter ett neg kotrollprov.	Ja	Ja, se smittskyddsblad	Ja, se smittskyddsblad	Kontakta alltid SME Smittskyddsanmälan
	<i>S. Typhi</i> <i>S. Paratyphi</i>	Diarré 2-5 dygn (1-10 dygn) Septisk 10-14 dygn	Ja, vid riskyрке och förskolebarn	Åter efter 3 negativa fecesodlingar	Åter efter 3 negativa fecesodlingar	Ja	Ja, se smittskyddsblad	Ja, se smittskyddsblad	Kontakta alltid SME Smittskyddsanmälan
	<i>Yersinia</i>	3-7 dygn (1-10 dygn)	Nej	Åter vid symtomfrihet	Åter vid symtomfrihet	Ja	Nej	Ja, se smittskyddsblad	Smittskyddsanmälan
Parasiter	<i>Cryptosporidium</i>	2-7 dygn (2 dygn-2 veckor)	Nej	Åter vid symtomfrihet	Åter vid symtomfrihet	Ja	Nej	Ja, se smittskyddsblad	Smittskyddsanmälan
	<i>Entamoeba histolytica</i>	Vanligen 2-4 veckor (några dagar upp till månader)	Nej	Åter vid symtomfrihet	Åter vid symtomfrihet	Ja	Nej	Ja, se smittskyddsblad	Smittskyddsanmälan
	<i>Giardia</i>	Vanligen 1-2 veckor	Ja, förskolebarn 3 veckor efter avslutad beh.	Åter efter beh. och vid symtomfrihet	Åter efter beh. och vid symtomfrihet	Ja	Ja, se smittskyddsblad	Ja, se smittskyddsblad	Smittskyddsanmälan
Virus	<i>Calicivirus</i>	12-48 timmar	Nej	Åter tidigast 48 timmar efter symtomfrihet	Åter tidigast 48 timmar efter symtomfrihet	Nej	Nej	Nej	Vid misstänkt utbrott kontakta SME
	<i>Rotavirus</i>	1-3 dygn	Nej	Åter tidigast 48 timmar efter symtomfrihet	Åter tidigast 48 timmar efter symtomfrihet	Nej	Nej	Nej	Vid misstänkt utbrott kontakta SME

* Riskyrken: Personer som arbetar med att bereda och hantera oförpackade livsmedel, vårdar spädbarn eller patient med kraftigt nedsatt immunförsvar

Smittskyddsbladet "[Hygienråd vid tarmsmitta](#)" delas ut till patienter med tarmsmitta