

Värmebölja och vård av covid -19



Där covid-19 smitta finns:

- Använd ej fläktar i rum där smittade personer är. Fläktar kan öka smittspridningen då de transporterar luft och partiklar längre sträckor.
- Använd istället AC-anläggning. AC sprider också luft, men mindre mängd än fläkt.
- Det är viktigt att covid-19 smittade personer inte blir för varma eller uttorkade.
- Använd i övrigt alla råd och checklistor i den befintliga handlingsplanen.

Läkemedel

- I eftervård av covid-19 kan vissa patienter behandlas med Fragmin. Fragmin i förfyllda sprutor är ett av läkemedel som är känsligt för temperaturer över 25. Säkerställ att rätt temperatur vid förvaring av läkemedel.
- Vid behandling av covid-19 så används ökade volymer intravenösa vätskor. Vid värmebölja kan även behovet av intravenösa vätskor öka. Säkerställ tillgång på intravenösa vätskor.

Där alla är friska från covid-19:

- Använd de råd och checklistor i handlingsplanen.
- Använd fläktar, men tänk på att stänga av fläkt vid bäddning och städning samt hantering av sår , in- och utfarter, steriluppdukning och liknande moment.
- Tänk fortsättningsvis på att hålla avstånd och handhygien.

Medarbetare i skyddsutrustning:

- Tag paus på svala platser och drick mycket vätska
- Svala arbetskläder
- Ordna specialplagg, ex. kylvästar