

---

## Vaccination av gravida mot Covid-19

### MEDICINSK INDIKATION

---

Risken att som gravid få Covid-19 infektion är densamma som för en icke gravid person. Majoriteten av de gravida med Covid-19 infektion får inga eller lindriga symtom. Symtomen är i stort sett samma som hos en icke gravid person. I sällsynta fall kan Covid-19 infektion orsaka svår sjukdom, den risken föreligger framförallt i senare del av graviditeten hos kvinnor med underliggande riskfaktorer.

De vaccin som för närvarande används i Sverige är samtliga godkända att ges till gravida under **hela** graviditeten.

### TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

---

- Alla personer som är födda 2005 eller tidigare, inklusive gravida, rekommenderas vaccination mot Covid-19
- Vaccination av gravida mot Covid-19 kan ske under hela graviditeten. FoHM rekommenderar dock att vaccination görs först **efter graviditetsvecka 12**. Motivet till denna rekommendation är att behovet av skydd mot Covid-19 är som störst i senare del av graviditeten samt att man vill undvika en felaktig koppling mellan missfall (vilket är vanligt fram till graviditetsvecka 12) och vaccination.
- **Undantag** till ovanstående
  - Gravid med särskilda medicinska riskfaktorer (beslut tas av ansvarig behandlande doktor) kan vaccineras tidigare i graviditeten.
  - Gravid som påbörjat sin vaccination i nära anslutning till graviditet eller innan vetskap om en tidig graviditet, de ska ta den **andra dosen** inom rekommenderat tidsintervall (dvs fyra veckor). Den andra dosen är viktig för ett gott och långvarigt skydd mot Covid-19.

### REFERENSER

---

Folkhälsomyndigheten

Vaccinationsansvarig Covid-19 Region Västmanland